WIKIPÉDIA

Avaceratops

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az ***Avaceratops*** a ceratopsia dinoszauruszok egy kis méretű neme, amely a késő kréta időszak campaniai korszaka idején élt a mai Egyesült Államok északnyugati részén.

Tartalomjegyzék

Avaceratops

Evolúciós időszak: késő kréta

PreЄ Є O S D C P T J K PgN

Az *Avaceratops* rekonstrukciója

Természetvédelmi státusz

Fosszilis

Rendszertani besorolás

Ország:	Állatok *(Animalia)*
Törzs:	Gerinchúrosok *(Chordata)*
Altörzs:	Gerincesek *(Vertebrata)*
Altörzság:	Állkapcsosok *(Gnathostomata)*
Főosztály:	Négylábúak *(Tetrapoda)*
Csoport:	Magzatburkosok *(Amniota)*
Osztály:	Hüllők *(Reptilia)*
Öregrend:	Dinoszauruszok *(Dinosauria)*
Rend:	Madármedencéjűek *(Ornithischia)*
Alrend:	*Cerapoda*
Csoport:	*Marginocephalia*
Alrendág:	*Ceratopsia*
Öregcsalád:	*Ceratopsoidea*
Család:	*Ceratopsidae*
Alcsalád:	*Centrosaurinae*
Nem:	***Avaceratops*** Dodson, 1986

Felfedezés és fajok

Az *Avaceratops* első fosszíliáit a montanai Judith River Formációban fedezték fel 1981-ben.[1] Széttagolódva találtak rájuk egy őskori folyómeder lerakódásában.[1] Az egyik *Avaceratops* példány teste valószínűleg egy homokturzásba temetődött el, miután az áramlat oda sodorta.[1]

Az első felfedezés Eddie Cole nevéhez fűződik, a fosszíliákat pedig Peter Dodson nevezte el 1986-ban, Eddie felesége, Ava után.[1] A faj a nevét a lelőhelyet magában foglaló földterület tulajdonosa, a Lammers család tiszteletére kapta.[1]

Osztályozás

Az *Avaceratops* a Ceratopsia alrendágban található Ceratopsidae család tagja (mindkét név az ógörög 'szarv arcú' szóból származik), amibe olyan papagájszerű csőrrel rendelkező növényevő dinoszauruszok tartoznak, melyek a mai Észak-Amerika és Ázsia területén éltek a kréta időszak során.

Azon kívül, hogy az *Avaceratops* egy ceratopsia, a taxonómiai elhelyezkedéséről kevés információ áll rendelkezésre. A csoport legkisebb ismert tagja, amely tömör nyakfodorral rendelkezik[1] (a *Triceratops* kivételével a nagyobb méretű ceratopsiák nyakfodrán rendszerint nyílások, úgynevezett

fenestrae-k találhatók), így talán a *Triceratops* őse lehet, vagy egy olyan pozíciót foglal el, ami a Centrosaurinae és a Ceratopsinae alcsaládok között található. Ez utóbbi elképzelés Paul Penkalski és Peter Dodson 1999-es cikkében jelent meg.

Fajok

- *A. lammersi* Dodson, 1986 (típus)

Hivatkozások


A Wikifajok tartalmaz ***Avaceratops*** témájú rendszertani információt.


A Wikimédia Commons tartalmaz ***Avaceratops*** témájú kategóriát.

Táplálkozás

Az *Avaceratops* a többi ceratopsiához hasonlóan növényevő volt. A kréta időszak során a virágos növények elterjedése „a szárazföldön földrajzilag behatárolódott", így valószínű, hogy ez az állat az időszak domináns növényeit, a páfrányokat, a cikászokat és a tűlevelűeket fogyasztotta, melyekről éles csőrével leveleket vagy tüskéket téphetett le.

Jegyzetek

1. *Avaceratops*. Publications International, LTD., 129. o. (1993). ISBN 0-7853-0443-6

Fordítás

- Ez a szócikk részben vagy egészben az *Avaceratops* című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának (https://en.wikipedia.org/wiki/Avaceratops?oldid=294637385) fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel.

Források

- Dodson, P.. *The Horned Dinosaurs*. Princeton University Press, Princeton, New Jersey (1996). ISBN 0-691-05900-4
- Penkalski, P & Dodson, P (1999). „The morphology and systematics of *Avaceratops*, a primitive horned dinosaur from the Judith River Formation (Late Campanian) of Montana, with the description of a second skull. (https://web.archive.org/web/20100715065720/http://www.vertpaleo.org/publications/jvp/19-692-711.cfm#)". *Journal of Vertebrate Paleontology* **19** (4), 692–711. o. [2010. július 15-i dátummal az eredetiből (http://vertpaleo.org/publications/jvp/19-692-711.cfm) archiválva]. (Hozzáférés ideje: 2009. július 31.)